

## **ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ**

Това изследване за ефикасността на Yin-Care бе проведено през 1991-1992 г. в Отделението по изгаряния в болница Дакинг.

Експериментът включваше 310 пациенти с изгаряне: 205 мъже, 105 жени, на възраст 4 до 46 години. Причините за изгаряне варираха от огън и горещи течности до киселини и алкали. 209 пациенти имаха свежи рани, 70 инфектирани, а 31 тежки рани от грануломен тип.

Като контролна група бяха избрани рани със същата степен на сериозност и дълбочина на различна част от тялото на същите пациенти.

В групата с Yin-Care беше прилаган директно 5% до 34% разтвор върху раните, след което бяха увивани с 12 до 16 пласта суха марля. Yin-Care и сухата марля бяха сменяни на всеки два дена.

Изгарянията в контролната група бяха увивани с марля, напоена или в масло от Radix Lithospermi или сребърен сулфадиазин.

Резултатите от лечението показаха, че Yin-Care значително намалява ексудацията през етапа на шок, намалява събирането на течност в тъканите, ускорява изсъхването на раните, облекчава чувствителността и възпалението на раните, спира сърбежа и увеличава издръжливостта на кожните присадки върху раните от грануломен тип.

Общият процент инфекции в групата с Yin-Care беше 10% в сравнение със значително по-високите 44% в контролната група.

***Действие на Yin-Care за лечение на изгаряния. Ма Юпенг и колектив. Отделение по изгаряния в болница Дакинг No. 1 завод за екстракция на масла, стр. 74-77***